

Aide à la prise de décision pour une demande d'examen par IRM – Lombalgie chez un adulte

Imagerie médicale

IMPORTANT : Au moment de transmettre votre demande d'examen par IRM à la Centrale de rendez-vous de l'HGH, pour un adulte souffrant d'une lombalgie, assurez-vous d'y joindre cet outil d'aide à la prise de décision. Les renseignements y figurant sont essentiels au traitement de votre demande et à la prise de rendez-vous sans délai.

RENSEIGNEMENTS SUR LA PATIENTE OU LE PATIENT

Nom			Prénom, initiale
Date de naissance			Numéro d'assurance-maladie
Jour	Mois	Année	

OUTIL D'AIDE À LA PRISE DE DÉCISION

Les études montrent que l'IRM pour examiner une lombalgie n'est pas utile (ne change en rien à la gestion de l'état de la patiente ou du patient, ou aux résultats escomptés) à moins que la personne manifeste des symptômes précis ou montrent des signes particuliers qui expliquent la sévérité de la douleur.

Afin de traiter et trier adéquatement votre demande pour un examen par IRM pour une lombalgie chez un adulte, cochez toutes les cases s'appliquant à la condition de votre patiente ou patient.

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Cancer présumé ou connu | <input type="checkbox"/> Détérioration neurologique sévère ou progressive |
| <input type="checkbox"/> Infection présumée ou connue | <input type="checkbox"/> Processus inflammatoire |
| <input type="checkbox"/> Fracture présumée ou connue | <input type="checkbox"/> Spondylarthrite ankylosante |
| <input type="checkbox"/> Syndrome radiculaire | <input type="checkbox"/> Syndrome de la queue de cheval |
| <input type="checkbox"/> Intervention chirurgicale lombaire antérieure | |
| Date et lieu : _____ | |
| <input type="checkbox"/> Intervention chirurgicale lombaire prévue | |
| Date and location: _____ | |
| <input type="checkbox"/> Examen par IRM recommandé dans un rapport d'imagerie antérieur (Joignez ce rapport à votre demande.) | |

Nota: En imagerie médicale, un examen par rayon X est habituellement recommandé pour les patientes ou les patients adultes qui souffrent d'une lombalgie chronique non complexe ou d'ostéoporose, qui ont été victimes d'un impact de faible vélocité, qui sont des utilisatrices ou des utilisateurs chroniques de stéroïdes ou des personnes plus âgées. En général, l'IRM et la tomodensitométrie (CT scan) ne sont pas recommandées aux patientes et patients dont la douleur est principalement causée par une lombalgie (située au-dessus du pli fessier et sous la 12^e côte).