


**GUIDE** | **TRAITEMENT  
D'IMMUNOTHÉRAPIE BCG**




## Avertissement

*Ce document contient des informations générales élaborées par L'Hôpital d'Ottawa. Elles ne visent pas à remplacer les recommandations d'un fournisseur de soins de santé qualifié. Veuillez consulter votre fournisseur de soins de santé qui sera en mesure de déterminer si ces informations sont appropriées à votre situation spécifique.*

## Qu'est-ce que le BCG ?

Le BCG (Bacillus Calmette-Guerin) est un médicament spécial utilisé dans le traitement du cancer de la vessie. Il s'agit d'une bactérie vivante, développée à l'origine pour traiter la tuberculose, mais réduite en intensité pour les traitements contre le cancer de la vessie. Le médicament est instillé dans la vessie par un cathéter urinaire et, une fois en contact avec le cancer, stimule une réaction pour tuer les cellules cancéreuses.

Les traitements sont administrés une fois par semaine pendant six semaines et se déroulent dans les unités de soins de jour à l'Hôpital général de Hawkesbury et district. On vous demandera de ne pas uriner pendant 2 heures après le traitement. Vous pourrez vous habiller et retourner chez vous. Vous devez rester à l'hôpital au moins 30 minutes après le premier traitement, mais après tous les autres traitements, vous pourrez partir une fois le traitement terminé.



## Avant votre traitement

- + Limitez votre consommation de liquide à 1 tasse (250 ml) de liquide pendant les 4 heures avant le traitement.
- + Ne prenez pas de **médicaments diurétiques** jusqu'à 2 heures après le traitement.
- + Urinez juste avant votre traitement.
- + Informez l'infirmière ou le médecin si :
  - Vous êtes enceinte
  - Vous avez un système immunitaire affaibli
  - Vous avez une infection urinaire
  - Vous avez subi une intervention de remplacement de valve cardiaque, un pacemaker ou l'insertion de l'équipement orthopédique.
  - Vous saignez ou avez de la fièvre.

## Le traitement

- + Une infirmière va insérer un cathéter urinaire dans votre vessie. Le cathéter sera introduit par votre urètre, dans la vessie, et évacuera toute l'urine restante avant l'instillation du BCG.
- + Le médicament est administré via le même cathéter et cela prend seulement quelques minutes. Le cathéter est retiré une fois le médicament administré.
- + On vous demandera de retenir le médicament dans votre vessie et de ne pas uriner pendant 2 heures après l'instillation. Le BCG est plus efficace lorsqu'il reste en contact avec la vessie. Il n'est pas nécessaire de vous allonger après la procédure; marcher ou être assis permettra au médicament de recouvrir la vessie. Vous pouvez vous lever et vous habiller.
- + Vous devez rester à l'hôpital au moins 30 minutes après votre premier traitement, et pour les traitements suivants, vous pouvez partir une fois le traitement terminé.

## Après votre traitement

- + Après 2 heures, à la fin du traitement, vous devez uriner pour éliminer le liquide. Il est important de ne pas éclabousser l'urine, vous devez vous asseoir sur les toilettes pour uriner. Essayez d'éviter les installations publiques.
- + Le contact de l'urine avec votre peau doit être évité pendant six heures après votre traitement. Si des éclaboussures se produisent, l'avez-vous avec du savon et de l'eau pour éviter toute irritation.
- + Si de l'urine est éclaboussée sur une surface, par exemple sur le siège des toilettes, la surface doit être nettoyée avec de l'eau de Javel. Cela peut être fait en versant une petite quantité d'eau de Javel sur un chiffon pour nettoyer la surface.
- + Pour des raisons de sécurité, après avoir uriné, ajoutez deux tasses (500ml) de javel domestique dans la cuvette de la toilette et laissez agir pendant 15 minutes avant de tirer la chasse d'eau. Répétez cette procédure après chaque miction jusqu'à 6 heures après votre traitement.
- + Buvez beaucoup de liquides, surtout pendant les premières heures après le traitement, pour laver la vessie. Augmentez votre consommation de liquide pendant la semaine suivant chaque traitement, **SAUF** le matin de votre traitement.
- + Certains patients peuvent ressentir une sensation de brûlure la première fois qu'ils urinent après le traitement. Augmenter votre consommation de liquide peut réduire cet effet.

## Quels sont les effets secondaires ?

Ce traitement est généralement bien toléré. La plupart des patients ont peu ou pas d'effets secondaires.

### Les effets secondaires les plus courants :

- + Fréquence accrue des mictions
- + Envie fréquente d'uriner
- + Douleur lors de la miction
- + Frissons légers, douleurs musculaires et fatigue
- + Nausées

- \* Si l'un de ces symptômes persiste ou s'aggrave après 24 à 48 heures, contactez votre médecin ou consultez un professionnel de la santé.
- \* Si le saignement persiste, votre médecin doit en être informé, car votre prochain traitement pourrait être reporté.

### Effets secondaires moins fréquents, mais graves :

- + Fièvre
- + Frissons sévères, tremblements
- + Douleurs articulaires
- + Vomissements
- + Fatigue sévère
- + Toux
- + Éruption cutanée
- + Maux de tête, vertiges
- + Fièvre de 38,5°C ou plus, consultez votre médecin — une fièvre ne sera peut-être pas causée par l'instillation, mais pourrait indiquer une infection.

**\*Vous devez consulter un médecin ou vous rendre aux urgences.**

Informez votre médecin ou infirmière de tout effet secondaire que vous pensez être causé par votre traitement, même s'il ne figure pas sur cette liste.

## Restrictions

- + Si vous êtes sexuellement actif/active, portez un préservatif lors des rapports sexuels pendant toute la durée du traitement.
- + Vous devriez pouvoir participer à toute autre activité après votre traitement, comme conduire.

\* Écoutez votre corps et, si vous vous sentez fatigué pendant une activité, ajustez votre emploi du temps pour inclure des périodes de repos.

**RAPPELEZ-VOUS :** si vous ressentez des effets secondaires graves et que vous ne pouvez pas joindre votre médecin, rendez-vous aux urgences les plus proches.



