

PRÉPARATION POUR COLOSCOPIE

PegLyte 2L

SUIVEZ ATTENTIVEMENT VOTRE PRÉPARATION INTESTINALE

Votre coloscopie est prévue le : _____ à _____
DATE HEURE

5 JOURS AVANT LA COLOSCOPIE

- + Évitez les noix, les graines, les baies, les fruits et légumes crus, l'avoine, le granola, les produits multigrains (pain, céréales, pâtes, riz brun, riz sauvage). Ces aliments sont plus longs à digérer et peuvent rester dans le côlon le jour de l'intervention, affectant la préparation de l'intestin.
Un échec de la préparation intestinale peut nécessiter une reprise de l'intervention.
- + Cessez de prendre des suppléments de fibres (ex. *Metamucil* or *Benefiber*).
- + Interrompre la supplémentation de fer et les anti-inflammatoires (ex. *Advil*, *Motrin*, *Aleve*).

1 JOURNÉE AVANT LA COLOSCOPIE

- + Mangez un déjeuner léger **avant 8h00**.
- + Pour éviter la déshydratation, ne buvez PAS que de l'eau
- + Buvez un mélange de liquides clairs jusqu'à la fin de l'intervention.
- + Les liquides clairs comprennent les jus sans pulpe (comme le jus de pomme), le café ou le thé (SANS lait ni substitut de lait), les boissons gazeuses (comme *7UP*, *Sprite* ou *Ginger Ale*), le *Gatorade/Powerade* ou le bouillon de soupe clair (sans viande, nouilles ou légumes).
- + Ne buvez PAS de liquides rouges.



EAU



JUS



BOISSON
GAZEUSE



BOISSON
ÉNERGISANTE



THÉ



CAFÉ



SOUPE
BOUILLON

Le matin

- + Préparez la solution intestinale en suivant les instructions et placez-la au réfrigérateur pour plus tard.

À 10h00

- + Prenez 2 (deux) capsules Dulcolax avec de l'eau.

Entre 15h00 et 16h00

- + Prenez 1 (une) capsules Dulcolax avec de l'eau ET buvez 1 litre du contenant de PegLyte (verre de 8 onces toutes les 10-15 minutes).
- + Vous pouvez refroidir le PegLyte et le boire rapidement pour faciliter sa consommation.
- + Laissez le litre restant au réfrigérateur pour plus tard.

Entre 20h00 et 21h00

- + Buvez le restant du contenant de PegLyte en une heure maximum.

JOURNÉE DE LA COLOSCOPIE

NE MANGEZ PAS

- + **3 heures avant votre rendez-vous : arrêtez de boire.**
- + N'ingérez rien à partir de ce moment.

- + **Votre côlon est vide lorsque la couleur de vos selles est de jaune à claire :**



INFORMATIONS IMPORTANTES

- + Arrivez à l'hôpital **1 heure** avant votre intervention avec une liste à jour de vos médicaments et allergies.
- + Enregistrez-vous à la réception.
- + Prévoyez de vous faire raccompagner par un adulte responsable que vous connaissez. La politique de l'hôpital n'autorise pas le retour à domicile en taxi.
- + Ne conduisez PAS et n'utilisez PAS de machines pendant 24 heures.
- + Pour toute question, veuillez téléphoner au 613-632-1111, poste 51704.

Consultez la page suivante pour obtenir des instructions sur les médicaments sur ordonnance.

MÉDICAMENTS SUR ORDONNANCE

Vous devez toujours prendre les médicaments qui vous ont été prescrits.

Les seules exceptions sont les suivantes :

Ozempic	<ul style="list-style-type: none">• Ne doit pas être pris dans les 7 jours avant l'intervention.
Anticoagulants	<ul style="list-style-type: none">• Arrêtez de prendre du Clopidogrel (<i>Plavix</i>) ou du Ticagrelor (<i>Brillinta</i>) 5 jours avant l'intervention, sauf avis contraire de votre médecin.• Arrêtez de prendre du Prasugrel (<i>Effient</i>) 7 jours avant l'intervention, sauf avis contraire de votre médecin.• Arrêtez l'Apixaban (<i>Eliquis</i>), le Rivaroxaban (<i>Xarelto</i>), le Dabigatran (<i>Pradaxa</i>) et l'Edoxaban (<i>Lixana</i>) 2 jours avant l'intervention, sauf avis contraire de votre médecin.• Arrêtez le warfarin (<i>Coumadin</i>) 5 jours avant l'intervention, sauf avis contraire de votre médecin. <p><i>*Si vous avez des antécédents d'accident vasculaire cérébral, d'infarctus du myocarde, de pose récente d'une endoprothèse coronaire ou d'une valve cardiaque mécanique, veuillez suivre les instructions données par votre médecin lors de la consultation.</i></p>
Médicaments pour diabétiques	<ul style="list-style-type: none">• Si vous prenez de l'insuline à action intermédiaire ou prolongée (ex. Levemir, Lantus, Tresiba, Toujeo), ne prenez que la moitié de votre dose habituelle la veille ou le matin de l'intervention.• <u>NE PRENEZ PAS</u> d'insuline à action rapide (ex. Humalog, Apidra, NovoRapid, Humulin-R, Novolin-R) le jour de l'intervention.• <u>NE PRENEZ PAS</u> de pilules pour le diabète le jour de votre intervention (ex. Metformine, Invokana, Januvia).• Le Semaglutide (Ozempic, Wegovy, Rybelsus), le Liraglutide (Saxenda, Victoza), le Tirzepatide (Mounjaro) et le Dulaglutide (Trulicity) ne doivent <u>PAS</u> être pris pendant les 7 jours précédant l'intervention.

