



À PROPOS DE LA CHIRURGIE

- + Un médicament sera administré afin d'assurer une sédation légère et de favoriser la détente.
 - L'état de conscience sera maintenu pendant toute la procédure, ce qui permettra de suivre les indications de l'équipe médicale.
- + Durée de l'intervention : 15 à 30 minutes.
- + La position sera allongée, le regard fixé sur une lumière vive.
- + Un instrument maintiendra l'œil ouvert pendant l'intervention.
- + La chirurgie n'est généralement pas douloureuse. Une sensation d'écoulement d'eau et une légère pression peut être perçue.
- + La cataracte sera retirée et remplacée par une lentille souple, conçue pour demeurer en place de façon permanente.
- + Si la chirurgie est planifiée dans un autre établissement, il est demandé d'en informer l'équipe rapidement au **613-632-1111**, poste **52339**, afin de permettre la réattribution du rendez-vous à un autre patient.
- + Si les symptômes n'affectent pas de manière significative la vie quotidienne, la chirurgie peut être reportée.

RESTRICTIONS D'ACTIVITÉS

Pendant 2 semaines

- Éviter de frotter l'œil ou d'exercer toute pression.
- Éviter de se pencher ou de soulever des objets lourds.
- Éviter les activités physiques intenses.
- Éviter le jardinage, les environnements poussiéreux, la baignade ainsi que l'utilisation de spa ou jacuzzi.

Pendant 1 semaine

- Évitez tout contact avec l'eau ou le savon dans l'œil.

SUIVI POST-CHIRURGICAL

Deux consultations de suivi sont requises :

Le jour même ou le lendemain (contrôle de la pression intraoculaire) et quelques semaines après la chirurgie.

La présence d'un accompagnant est requis pour ces deux rendez-vous.

La prescription de lunettes pourra être réévaluée environ six (6) semaines après la chirurgie, (par votre optométriste).

SIGNES À SURVEILLER

Se rendre immédiatement à l'urgence en présence de :

- Altération ou diminution de la vision
- Gonflement
- Douleurs oculaire
- Écoulement
- Rougeur croissante



OPTIONS DE LENTILLES INTRAOCULAIRES (LIO)

À noter que certaines lentilles avancées ne conviennent pas à tous, notamment en cas de pathologies oculaires spécifiques. Votre ophtalmologiste évaluera cette possibilité selon votre cas. De plus, le coût des lentilles avancées dépend de votre couverture provinciale en matière de soins de santé.

Détails	Standard	Tecnis	Eyhance	Pure See	Odyssey
Vision de loin	Excellente	Excellente	Excellente	Excellente	Excellente
Vision à l'ordinateur	Moyenne	Moyenne à bonne	Bonne	Très bonne	Excellente
Vision de lecture	Limité	Limité	Limité à moyenne	Moyenne à bonne	Très bonne à excellente
Possibilité de réduire la dépendance aux lunettes	Faible	Faible	Faible à moyenne	Moyenne	Très élevée
Conduite la nuit	Excellente	Excellente	Excellente	Excellente	Bonne
Halos-Éblouissements	Très faibles	Très faibles	Très faibles	Très faibles	Plus fréquents
Idéal pour les patients qui désirent...	Faible coût	Légère amélioration quant à une lentille monofocale de base	Meilleure vision à l'ordinateur	Plus grande plage de vision	Plus grande indépendance aux lunettes
Coûts en Ontario	Gratuit	\$160 \$860 Toric*	\$535 \$1,160 Toric*	\$1,310 \$1,660 Toric*	\$1,310 \$1,660 Toric*
Coûts au Québec	Gratuit	\$310 \$1,010 Toric*	\$685 \$1,310 Toric*	\$1,460 \$1,810 Toric*	\$1,460 \$1,810 Toric*

* Les lentilles toriques corrigent l'astigmatisme. Le premier prix s'applique aux patients sans astigmatisme significatif; le prix torique s'applique lorsqu'une correction de l'astigmatisme est recommandée.

POUR TOUTES QUESTIONS NON URGENTE

Téléphoner votre optométriste ou la Clinique de soins ambulatoires de l'HGH 613-632-1111, poste 52202.